

Tertiär-Abfolge Schichtstufen-/

Kiesrand, obermaaten bis platan
Mittel- bis Grobstrand, Kiesig, steinig, rotbraun, teilweise
zu Kiesstrand umgewandelt, nur 100 Schichtmächtigkeit

Dolomit-Kalkstein (Eisohern)
Dolomit bis Kalkstein, dolomitisch, mit Algen- und
Pflanzenabdrücken. (Dolomit und Kalkstein, Kalk)

Konrad von Moltke

Ries-Auswurfmassen

Polymikte Kristallbreccie
Impakbreccie, überlagert als Kristallmetakonglomerat.

Dianthus oder Brackee des mediterranen Beckenlandes, selten Grundstängelknospenrispen, mit elliptischen Schalen bis 25 m Durchmesser.

Ureteric impaction/hole

1800

1

0

 Bohrung.

Brunnen

—

--	--

	之
--	---

vorhaben.	Min
-----------	-----

Was

W.


Maßstab:

1 : 25.000

by



	0000-0000
--	-----------



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO FÜR
GEOTECHNIK UND UMWELT GMBH
Tel. 0951 302084-0 Fax: 0951 302084-20

24.06.2022

Dokument in 207492 OGIS.gaz